

Patientenmerkblatt

Chirurgie

Toxic-Shock-Syndrom

Sehr geehrte Eltern

Das Toxic-Shock-Syndrom (TSS) ist ein schweres Kreislauf- und Organversagen, das sehr selten auftritt. Hervorgerufen wird es durch Bakterien(-toxine), meist nach Bagatellunfällen oder Verbrennungen/Verbrühungen.

Die Symptome treten meist um den 2. Tag nach Verletzung auf und sind sehr unspezifisch.

Symptome (können sehr schnell auftreten und sehr heftig sein):

- Fieber/Körpertemperatur $\geq 38,9$ °C
- Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall
- Bewusstseinsveränderungen bis -eintrübung, Desorientierung oder Verwirrheitszustände
- grossflächiger Hautausschlag und/oder blaue Flecken (Hämatome)
- Rötung der Augen sowie der Mund- und der Vaginalschleimhaut
- Muskelschmerzen
- niedriger Blutdruck (kann sich durch Ohnmacht oder Schwindelanfällen äussern)

Häufig sind die Zeichen unspezifisch und können denen eines grippalen Infektes, einer Magen-Darm-Grippe oder exanthematösen Kinderkrankheiten (Krankheiten mit Hautausschlag) ähnlich sehen.

Sollten Sie bei Ihrem Kind oben genannte Symptome nach Verbrennung oder Verbrühung bemerken, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf, oder melden Sie sich auf unserer Notfallstation im Spital Davos.

Bei Fragen oder Unklarheiten bitte auf unserer Notfallstation anrufen:

Tel. Nr. +41 81 414 81 00